

العناية بالعدسات الصلبة H.W RGP وتعليم المستخدمين

إتش دبليو (H.W) تؤكد إمدادكم بعدسات صلبة (RGP) ذات درجة عالية من الجودة مقارنة بما هو موجود من عدسات أخرى. كما تؤكد أن مستخدمي عدسات (H.W) سيحصلون على أقصى قدر من الراحة ووحدة ووضوح الرؤية.

تنبيه: لا تصرف العدسات إلا بمعرفة الطبيب المختص

الوصف:

توفر H.W لكم العدسات الصلبة المنتجة بالخراءطة والتي تعطي سطحًا متناهياً الدقة، وتتميز بالإنتقال التدريجي المندمج للسطح المحيطي وكذلك حافة العدسة الناعمة المستديرة. وعدسات H.W ذات خواص مستقرة متفردة لا تتغير طوال مدة استخدام العدسات.

H.W RGP30 (فلورو سيليكون أكريلات، 2% Fatt) هي عدسات للاستخدام اليومي وهي متوافرة لكل حالات قصر النظر وطول النظر وحالات إزالة عدسة العين (المياه البيضاء) وحالات تباين الرؤية (استجماتيزم) حتى 3D تباين وكذلك حالات القرنية المخروطية.

H.W RGP 60 (فلورو سيليكون أكريلات، 5% Fatt) هي عدسات للاستخدام اليومي وهي متوافرة لكل حالات قصر النظر وطول النظر وحالات إزالة عدسة العين (المياه البيضاء) وحالات تباين الرؤية (استجماتيزم) حتى 3D تباين وكذلك حالات القرنية المخروطية وهي عدسات توفر للمرضى نفاذية أكثر للأكسجين.

اقتراحات الإستبدال:

H.W RGP 30 ينصح بإستبدالها بعد 12 شهر من الإستخدام.

H.W RGP 60 ينصح بإستبدالها بعد 10 شهور من الإستخدام.

- إذ ما أستخدمت العدسات بما يتجاوز فترة الإستخدام الموصي بها فإن أدائها سيتدحرج وهذا يظهر كنقص في الراحة وزيادة في الرواسب وتدحرج في الرؤية وزيادة الإحساس بالعدسة.

- برنامج الأستبدال المقترن يُقلل مما هو موصي به فوراً إذا ما لوحظ ظهور أي رواسب على العدسات المستخدمة.

طريقة إستعمال عدسات H.W RGP الصلبة:

كيفية وضع العدسة في العين:


1- رجاء غسل اليدين وشطفهم وتجفيفهم جيداً بإستخدام فوطة نظيفة قبل مسك العدسات.

2- تتم عملية اللبس فوق قماش نظيف موضع فوق منضدة وليس فوق حوض الحمام.

3- إستخدم مرآة متحركة فذلك يساعد على تحديد وضع العدسة على قرنية العين وعدم لمسها للجفن العلوي أو السفلي.

4- ضع العدسة في راحة اليد وتأكد أن العدسة خالية من أي شوائب أو جروح أو آثار مستحضرات التجميل.

5-نظف وأشطف العدسة جيداً بمحلول بوسطن (Boston Simplus Multi) (Action).



6-للعين اليمنى ضع العدسة على طرف سبابة اليد اليمنى وضع الأصبع الوسطى لليد اليسرى على رموش الجفن العلوي لرفع الجفن إلى أعلى. ضع الأصبع الوسطى لليد اليمنى على رموش الجفن السفلي لإزاحة الجفن إلى أسفل (شكل 1). إزاحة الجفون بكفاءة له أهمية كبيرة.

7-أنظر إلى الأمام في المرأة الموضوعة على المنضدة أو النيش وأقرب بالعدسة حتى تصبح ملامسة للعين (شكل 2).



8-ابعد أولاً الأصبع حامل العدسة ثم حرر الجفن السفلي ثم الجفن العلوي.


9-كرر كل ما سبق معكوساً (أي اليمنى بدل اليسرى والعكس) للعين الأخرى.

كيفية نزع العدسة من العين:

*ملحوظة: السمه يثير لموضع العدسة

1- رجاء غسل اليدين وشطفهم وتجفيفهم جيداً بإستخدام فوطة نظيفة قبل نزع العدسات.

2- إستخدم إصبع السبابة لليد اليمنى لنزع عدسة العين اليمنى واليسرى لنزع عدسة العين اليسرى وذلك لإخراج العدسة من العين.




3- ضع السبابة على موضع الإتصال العرضي للجفنين (شكل 3).

4- والعين مفتوحة جيداً إجذب الجفون عرضياً وفي نفس الوقت إرمي بالعين وذلك يكفي لطرد العدسة من العين (شكل 4).

5- يمكن تنفيذ طريقة نزع العدسة هذه بإستخدام كلا السبابة والوسطى لنفس اليد لحت العدسة أكثر على ترك العين.

6- ضع راحة اليد الأخرى مفتوحة تحت العين لكي تسقط العدسة عليها إن لم تلتتصق برموش الجفن السفلي.




ملحوظة: هناك طرق أخرى لنزع العدسات الصلبة من العين. لذلك يرجى إتباع تعليمات المتخصص المحترف للطريقة التي يوصي بها.


إعادة تمركز (سترة) العدسة على القرنية:

1- إذا ما لاحظ المريض ضبابية الرؤية لإحدى عينيه، فهناك إحتمالية إزاحة العدسة من على القرنية. يمكن تحديد مكان العدسة المزاحة بإستخدام مرآة أو يوضع الإصبع بخفة على مناطق الجفن المختلفة لتحديد المنطقة التي تعلو العدسة.

شكل 5



2- بعد تحديد وضع العدسة أنظر في الإتجاه بعيد عن العدسة وضع إصبعك على الجانب بعيد من العدسة ثم انظر تجاه العدسة حتى تستعيد وضعها على القرنية (شكل 5,6).



3- عادة ما تزداد ثقة المريض ويستعيد وضع العدسة على القرنية بهدوء بدون الحاجة لاستخدام الجفون.

شكل 6

تعليمات الإستخدام:

1- إغسل وأشطف وجف وجف يديك بفوطة نظيفة وبعناية كل مرة قبل التعامل مع

- العدسات أو لمسها.
- نظف وأشطف العدسة جيداً بعد كل إستخدام.
 - ضع العدسة في راحة اليد و بإستخدام محلول بوسطن (Boston Simplus Multi Action) قم بتدليك العدسة بلطف لمدة 20 ثانية ثم أشطف كلاً وجهيها جيداً بالمحلول.
 - ضع العدسة داخل الحافظة وأغمرها بمحلول بوسطن (Boston Simplus Multi Action).
 - كرر نفس التعليمات بالنسبة للعدسة الثانية.
 - نقترح على الحافظة بمحلول بوسطن (Boston Simplus Multi Action) وحفظها معك حتى إذا ما لجأت لنزع العدسة اضطرارياً تجدها جاهزة لاستقبال العدسة.

التحذيرات:

- 1- يجب تقاديم الضغط على العدسة باليد او التعامل معها بخشونة قبل وضعها بالعين فإن ذلك قد يؤدي إلى انبساط العدسة أو حدوث حكة أو التهاب بالعين.
- 2- يرجى وضع مساميق التجميل بعد إرتداء العدسات وتوضع المسمايق على الجفن العلوي فقط ولا توضع محددات العين على حدود الجفن الداخلية.
- 3- تزال المسمايق بعد نزع العدسات من العين.
- 4- مساميق التجميل ذات التركيبة المائية أقل ضرراً على العدسات من المسمايق ذات التركيبة الزيتية.
- 5- لا تسمح بلامسة سطح العدسات لماء الصنبور او اللعب أو أي محاليل تم تركيبها في المنزل أو أي محاليل غير معقمة غير التي تم أقتراحها من قبلنا لتخزين العدسات.
- 6- إستخدم حافظة عدسات ذات مكان حفظ عميق ومسلح لأن العدسة ممكن أن تلتتصق بسطح الحافظة الناعم إذا وضعت عن طريق الخطأ بحيث سطحها المدبب إلى أعلى، وهذا من الممكن أن يسبب هنمات بحافة العدسة عند محاولة فصلها من الحافظة.
- 7- رجاء تغيير الحافظة بإستمرار (كل 3 شهور على الأقل). كما يجب تعقيم الحافظة بإنتظام (كل أسبوع) وذلك إما بغليها في الماء وتجفيفها بالهواء أو بوضعها وهي جافة في الميكروويف لمدة ثلاثة دقائق.
- 8- عدم محاولة السباحة أو الأستحمام وأنت ترتدي العدسات، إلا إذا أخذت الاحتياطيات المناسبة، فإن ذلك قد يسبب مضاعفات أو التهابات بالعين.
- 9- يرجى عدم إستخدام الكريمات أو البخاخات داخل العين.
- 10- تقاديم لبس العدسات في حالة الأجهزة الكيميائية أو الغبار أو الحرارة الموجهة (مجف الشعر).
- 11- بعد نزع العدسات يرجى غمرها في محلول بوسطن (Boston Simplus Multi Action) جديد لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو طوال الليل ودائماً تخلص من محلول المستعمل وإبدأ بمحلول جديد ولا تضيف محلول الجديد على محلول المستخدم.
- 12- في حالة عدم إستخدام العدسات لمدة طويلة يرجى تغيير محلول الحفظ كل أسبوع للمحافظة على تعقيم العدسات.
- 13- لا ترتدي العدسات في حالة وجود حساسية أو التهاب أو أحمرار بالعين.
- 14- لا تحفظ العدسات طول الليل في محلول الملح (Saline) لأن ذلك لا يحمي العدسات من الميكروبات أو العدوى.
- 15- إذا شعرت بعدم إرتياح في لبس العدسات أو أنها جافة أنزعها من العين وقم بشطفها بمحلول بوسطن (Boston Simplus Multi Action) وإنظر بعدها بضع دقائق وحاول مرة أخرى فإذا ظلت المشكلة مستمرة إنزع العدسات وراجع أخصائي البصريات.

- 16- لا ترتدى العدسات أكثر من 10 ساعات في اليوم.
- 17- لا ترتدى العدسات أثناء النوم ولكن يمكن أخذ إغفاءة قصيرة (1-2 ساعة) أثناء إستعمال العدسات ذات الإستخدام اليومي.
- 18- عند حدوث أي من الحالات التالية لا تستخدم العدسات ويرجى مراجعة الطبيب فوراً:
 - وجود التهاب أو مرض أو عدوى بالعين.
 - وجود أحمرار شديد أو تهيج شديد بالعين.
 - وجود حالات حادة أو دائمة حول الأجسام المضيئة.
 - وجود دموع متزايد أو إفرازات متزايدة.
 - وجود ضبابية دائمة في الرؤية (المدة ساعة).
 - إستخدام أدوية لا تتوافق مع إستخدام العدسات بما في ذلك محليل التنظيف التي لا ينصح بإستخدامها مع العدسات.
 - عدم التمكن من الحصول على مستوى النظافة اللازم والمصاحب لإستخدام العدسات.

تحذيرات الوقاية:

الأشخاص الذين لم يستخدمو العدسات اللاصقة أو الذين إنقطعوا عن إستخدامها (المدة أكثر من أسبوعين) ينصح بلبس العدسات لمدة ساعتين على الأكثر في اليوم الأول للبس ثم تزداد المدة بالتدريج (ساعتين زيادة يومية) بشرط ألا يزيد زمن اللبس عن 10 ساعات يومياً.

موانع الإستعمال:

من الممكن أن يؤدي إستخدام العدسات إلى حدوث الأعراض التالية خاصة خلال الفترة الأولى من التعود على لبس العدسات:

إردياد الدموع - الإحساس بمضايقة خفيفة - الإحساس بوجود جسم غريب - أحمرار غير كثيف بالعين - حساسية للضوء وحساسية أكثر للريح أو الدخان أو التراب - ضبابية متقطعة في الرؤية - مشكلة في النظر إلى أعلى - ترميش زائد - حركة العدسة زائدة وهي على العين.
في حالة إستمرار هذه الأعراض توقف عن لبس العدسات وراجع الطبيب.

إنه من النادر حدوث قرحة بالقرنية تؤدي إلى التدهور البصري ولكن في حالة عدم اتباع التعليمات الصحيحة أو إستخدام العدسات لمدد أطول مما هو منصوص عليه فإنه من الممكن حدوث القرحة كما تزداد إحتمالية حدوث القرحة للأشخاص المدخنين.

تاریخ آخر نسخة منقحة 1 / 2009

شركة أتش دبليو للعدسات اللاصقة
3 ش الشهيد مختار سعيد ارض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة - مصر.